

1. cachorro-do-mato

Cerdocyon thous



Também conhecido como graxaim-do-mato ou raposa-caranguejeira.

Alimentação

Sua dieta inclui frutos (sendo considerado um dispersor de sementes), ovos; artrópodes; anfíbios; répteis; mamíferos de pequeno porte; crustáceos; e carcaças de animais mortos.



Distribuição



Características

O corpo mede de 60 a 70 cm, cauda 22 a 41 cm e o peso varia entre 5,5 a 8,5 kg. Animal de médio porte, baixo e robusto, com o focinho curto, e orelhas pequenas e arredondadas, possui cauda moderadamente espessa. Possui uma atividade importante para o meio ambiente, como a dispersão de sementes de plantas nativas, contribuindo para a manutenção da flora da região. É também uma espécie monogâmica.

2. cuíca-de-três-listras

Monodelphis iheringi

Alimentação

Ele é um animal onívoro-insetívoro, ou seja, se alimenta de insetos e vegetais.



Distribuição

Restrita ao sudeste e sul do Brasil, a cuíca-de-três-listras pode ser encontrada em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

É uma das maiores raridades da Mata Atlântica e também é chamada de catita.

Aspectos Físicos

Medida da cabeça e corpo em torno de 8,7cm; cauda: em torno de 4,7cm. Apresenta pelagem dorsal marrom com três faixas longitudinais negras sendo a central do focinho à base da cauda.

Características e Habitat

A espécie passa a maior parte do tempo debaixo da terra, saindo somente para caçar. É extremamente ágil, deslocando-se com facilidade em túneis sob a vegetação e pequenas trilhas subterrâneas. Pela degradação de seu habitat, não se sabe ao certo o número de indivíduos restantes.

