

1. coruja-de-igreja

Tyto alba

Características

Possui em média 33 a 36 centímetros (macho) e 32,5 a 38 centímetros (fêmea) de comprimento e envergadura entre 75 e 110 centímetros, as fêmeas pesam em média 330 a 573 gramas e os machos de 310 a 507 gramas. Especula-se que os machos tendem a ser mais brancos e as fêmeas mais pardas, mas por haver variações individuais, esta característica não consegue definir um dimorfismo sexual com exatidão nestes animais.



Alimentação



É uma grande caçadora de ratos, sejam silvestres, sejam espécies introduzidas de fora das Américas. Como todas as corujas, ingere o alimento inteiro.


Também conhecida por coruja-das-torres, coruja-branca, rasga-mortalha, coruja-do-campanário, coruja-de-celeiro ou suindara.



Hábitos

De hábitos noturnos, prefere presas vivas. Se perturbadas, balançam o corpo lateralmente. Se encurraladas, jogam-se de barriga para cima, enfrentando o perigo com as poderosas garras que lançam para frente. Voa durante o dia apenas quando afugentada de seu poleiro de descanso, que pode ser em folhas de palmeiras, bananeiras, galhos de outras árvores ou sob telhados em construções.

Distribuição



Comportamento

É uma espécie muito especializada, caça suas presas localizando-as principalmente pela audição. Quando se assusta durante o dia ou quando quer amedrontar, bufa fortemente podendo estalar com o bico. Os olhos delas não são esferas, mas sim tubos que providenciam uma percepção de profundidade melhor e permite que elas vejam suas presas a grande distância - por outro lado a visão aproximada não é tão clara.



Extinção

Tendo em conta a ampla área de distribuição da espécie, os fatores de ameaça também são diversos e fazem-se sentir em graus distintos nas diferentes populações. As suas ameaças incluem alterações climáticas, o uso de pesticidas e a redução de presas disponíveis, quer pela perda e fragmentação de áreas de pradaria quer pela intensificação agrícola.

