

1. pica-pau-rei

Campephilus robustus

Alimentação


Possui dieta insetívora, forrageando em árvores infestadas de insetos e larvas. Perfuram a casca, e capturam as presas com a língua.

Seu nome científico significa ave forte que adora lagartas.

Conhecido também como pica-pau-de-cabeça-vermelha, pica-pau-galo, pica-pau-grande, pica-pau-soldado e pinica-pau.



Distribuição



Características e Habitat

Mede cerca de 36 centímetros de comprimento, com peso médio de 200 gramas. Possui a cabeça e o pescoço vermelhos, dorso creme, asas e cauda negras. Embora úteis ao homem no controle de insetos e larvas nocivas à madeira, os pica-paus podem provocar alguns estragos em pomares.

2. chupim

Molothrus bonariensis

Alimentação

Possui uma dieta onívora, alimentando-se principalmente de insetos e sementes, mas ocasionalmente come frutos.

Seu nome científico significa: Pássaro de Buenos Aires que luta pela atenção dos pais.



Distribuição



Características

Mede cerca entre 17 e 21,5 centímetros de comprimento e pesa entre 44,9 e 63,7 gramas. O macho adulto é preto-azulado, mas dependendo da iluminação só se enxerga a cor negra. A fêmea é marrom-escura.

Também conhecido por azulego, maria-preta, chopim, vira-bosta, chupim-vira-bosta, godero, godelo, gaudério, cupido, papa-arroz-escuro, rola-bosta, engana-tico, maria-uadia e azulão-de-chiqueiro.

Hábitos

Habita paisagens abertas como campos, pastos, parques e jardins. Entre junho e setembro é muito gregário, concentrando-se em pousos noturnos comunitários ou buscando alimentos em gramados e áreas campestres com capim baixo.

